

Зил Т, таблетки

Хомеопатичен лекарствен продукт

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Зил Т и за какво се използва
2. Преди да приемете Зил Т
3. Как да приемете Зил Т
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Зил Т
6. Допълнителна информация

1. Какво представлява Зил Т и за какво се използва

Хомеопатичен лекарствен продукт.

Използва се при артроза /особено гонартроза/, полиартроза, спондилартроза, хумероскапуларен периартрит.

2. Преди да приемете Зил Т

Не приемайте Зил Т ако имате свръхчувствителност към отровен бръшлян, арника и/ или някоя от основните или помощни съставки на продукта. Да се използва след консултация с лекар при настоящи или минали чернодробни заболявания и/или при едновременното приемане с хепатотоксични вещества.

Този лекарствен продукт съдържа лактоза. Ако имате непоносимост към някои захари се консултирайте с лекар преди приемането на този лекарствен продукт.

Употреба на други лекарства - не са известни лекарствени взаимодействия

Употреба на Зил Т с храни и напитки - няма несъвместимости.

Бременност и кърмене - посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство. Тъй като продукта съдържа Sanguinaria, да не се използва по време на бременност и кърмене.

Шофиране и работа с машини - Зил Т не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини.

3. Как да приемете Зил Т

Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Обикновено 3-5 пъти по 1 таблетка дневно. Таблетките не се гълтат, а се държат в устата до разтварянето им.

Поглъщането на таблетката не води до никакви вредни последствия както при деца, така и при възрастни!

Употреба при деца

При деца до 3 год. възраст - по 1/2 таблетка до 3 пъти дневно.

От 3 до 6 год. възраст - по 1 таблетка до 3 пъти дневно.

Над 6 год. възраст - дозата за възрастни.

Ако сте приели повече от обичайната доза - Зил Т няма доза на предозиране.

Ако сте пропуснали да приемете Зил Т - Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а продължете по указаната схема.

Ако сте спрели употребата на Зил Т - Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако симптомите продължат или състоянието се влоши да се направи консултация с лекар.

4. Възможни нежелани реакции

По време на лечението с продукти, съдържащи *Sanguinaria*, има съобщавани случаи на повишени нива на чернодробните функционални ензими (трансаминаза) и увеличение на серумния билирубин до лекарствено-индуцирана жълтеница (иктер; лекарствено обусловен токсичен хепатит), които се нормализират или понижават след прекратяване на приема на лекарството. В много редки случаи могат да се появят гастроентестинални усложнения или кожни реакции - до няколко дни след приема на лекарството. В единични случаи реакции на свръхчувствителност могат да се появят при пациенти с доказана свръхчувствителност към растения от сем. сложноцветни (*Anacardiceae*), т.е. арника.

5. Как да съхранявате Зил Т

Без специални условия на съхранение.

Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца!

Срок на годност - 5 години.

Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

Лекарствата трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Допълнителна информация

Какво съдържа Зил Т:

1 таблетка съдържа:

Активни вещества:

Cartilago suis D4 - 0,3 mg;

Funiculus umbilicalis suis D4 - 0,3 mg;

Embryo suis D4 - 0,3 mg;

Placenta suis D4 - 0,3 mg;

Rhus toxicodendron D2 - 0,54 mg;

Arnica montana D1 - 0,6 mg;

Solanum dulcamara D2 - 0,15 mg;

Symphytum D8 - 0,15 mg;

Sanguinaria canadensis D3 - 0,45 mg;

Sulfur D6 - 0,54 mg;

Nadidum D6 - 0,3 mg;

Coenzym A D6 - 0,3 mg;

Natrium diethyloxalaceticum D6 - 0,3 mg;

Acidum silicicum D6 - 3 mg;

Acidum alpha-liponicum D6 - 0,03 mg.

Помощни вещества:

Магнезиев стеарат: 1,5 mg.

Как изглежда и какво съдържа опаковката:

Пластмасов контейнер, съдържащ 50 таблетки/ картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба и производител:

Biologische Heilmittel Heel GmbH, Германия.

Дата на последно одобрение на листовката: 03.2011.