

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

СТОДАЛ, сироп STODAL, syrup

Хомеопатичен лекарствен продукт

Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Вижте точка 4.

В тази листовка:

1. Какво представлява **СТОДАЛ, сироп**, и за какво се използва?
2. Преди да приемете **СТОДАЛ, сироп**
3. Как да приемате **СТОДАЛ, сироп**?
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате **СТОДАЛ, сироп**?
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СТОДАЛ, сироп, И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?

СТОДАЛ, сироп, е хомеопатичен лекарствен продукт, традиционно използван за симптоматично лечение на кашлица от различен произход.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕ СТОДАЛ, сироп:

Не приемайте СТОДАЛ, сироп:

Ако сте алергични (свръхчувствителни) към активните вещества или към някоя от останалите съставки на СТОДАЛ, сироп.

Обърнете специално внимание при употребата на СТОДАЛ, сироп:

Този лекарствен продукт съдържа 1,74 % V/V етанол (алкохол).

Една доза от 5 ml от сиропа съдържа 0.069 g етанол. Една доза от 15 ml от сиропа съдържа 0,206 g етанол.

Вреден за хора, страдащи от алкохолизъм.

Да се има предвид при бременни или кърмачки, деца и високо рискови групи като пациенти с чернодробно заболяване или епилепсия.

Една доза от 5 ml от сиропа съдържа 3,75 g захароза. Една доза от 15 ml от сиропа съдържа 11,25 g захароза.

Това трябва да се има предвид при пациенти със захарен диабет (diabetes mellitus). Ако Вашият лекар ви е информирал, че имате непоносимост към някои видове захари, свържете се с него преди да приемете това лекарство.

Употреба на други лекарства

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Прием на СТОДАЛ, сироп, с храни и напитки

Този лекарствен продукт трябва да се приема между храненията.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини

Няма наблюдавано въздействие върху способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация относно някои от съставките на СТОДАЛ, сироп:

Списък на помощните вещества с доказан ефект: етанол, захароза.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ СТОДАЛ, сироп?

Перорално приложение.

Възрастни: по една доза от 15 ml от сиропа, измерена с мерителната чашка, 3 до 5 пъти дневно.

Деца: по една доза от 5 ml от сиропа, измерена с мерителната чашка, 3 до 5 пъти дневно.

Ако сте приели повече от необходимата доза СТОДАЛ, сироп:

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да приемете СТОДАЛ, сироп:

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на СТОДАЛ, сироп:

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този лекарствен продукт, моля, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, СТОДАЛ, сироп, може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Не се очакват нежелани лекарствени реакции.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно на Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев” № 8

1303 София

Тел.: +35928903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ СТОДАЛ, сироп?

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте СТОДАЛ, сироп, след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.

СТОДАЛ, сироп, може да се използва до 12 месеца след датата на първоначалното отваряне на бутилката.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа СТОДАЛ, сироп?

Състав за 100 g

- Активните вещества са :

Anemone pulsatilla 6 СН.....	0.95 g
Rumex crispus 6 СН.....	0.95 g
Bryonia 3 СН.....	0.95 g
Ipсacuanha 3 СН.....	0.95 g
Spongia tosta 3 СН.....	0.95 g
Sticta pulmonaria 3 СН.....	0.95 g
Antimonium tartaricum 6 СН.....	0.95 g
Myocarde 6 СН.....	0.95 g
Coccus cacti 3 СН.....	0.95 g
Drosera ТМ.....	0.95 g

- Помощни вещества: сироп от толутанов балсам, сироп от полигала, захарен сироп, карамел, бензоена киселина, етанол 96 об.%

Как изглежда СТОДАЛ, сироп, и какво съдържа опаковката?

Сироп, бутилка 200 ml и мерителна чашка.

Притежател на разрешението за употреба и Производител:

BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Франция